

ALGÈBRES DE FROBENIUS - VIRASORO

Maxime REBOUT¹, Vadim SCHECHTMAN¹

1 Introduction

Considérons un couple $\mathfrak{g} = (\mathfrak{l}, \langle, \rangle)$, où $\mathfrak{l}$ est une algèbre de Lie sur un anneau commutatif de base k fixé et

$$\langle, \rangle : \mathfrak{l} \times \mathfrak{l} \longrightarrow k$$

est une forme k -bilinéaire symétrique $\mathfrak{l}$ -invariante (on pourrait appeler un tel couple *une algèbre de Lie Frobenius*). On supposera désormais que k contient $\mathbb{Q}$. On sait associer à $\mathfrak{g}$ une algèbre vertex $V_{\mathfrak{g}}$, le module "vacuum" sur l'algèbre de Kac-Moody $\hat{\mathfrak{g}}$ correspondante, [K].

Celle-ci est une k -algèbre vertex $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ -graduée, $V_{\mathfrak{g}} = \bigoplus_{n \geq 0} V_{\mathfrak{g}, n}$ avec $V_{\mathfrak{g}, 0} = k \cdot 1$, 1 désignant le vecteur vacuum, $V_{\mathfrak{g}, 1} = \mathfrak{l}$, la structure d'un k -module sur $V_{\mathfrak{g}, 1}$ est induite par l'opération $(-1) : V_{\mathfrak{g}, 0} \times V_{\mathfrak{g}, 1} \longrightarrow V_{\mathfrak{g}, 1}$, l'opération

$$(-1) : V_{\mathfrak{g}, 1} \times V_{\mathfrak{g}, 1} \longrightarrow V_{\mathfrak{g}, 1}$$

coïncide avec le crochet de Lie sur $\mathfrak{l}$ et l'opération

$$(1) : V_{\mathfrak{g}, 1} \times V_{\mathfrak{g}, 1} \longrightarrow V_{\mathfrak{g}, 0}$$

coïncide avec l'accouplement $\langle, \rangle$.

Alors $V_{\mathfrak{g}}$ est caractérisée par la propriété universelle suivante : un morphisme de $V_{\mathfrak{g}}$ dans une algèbre vertex V quelconque est la même chose qu'un morphisme de k -modules $\phi : \mathfrak{l} \longrightarrow V$ tel que

$$\phi([x, y]) = \phi(x)_{(0)} \phi(y)$$

et

$$\langle x, y \rangle \cdot 1_V = \phi(x)_{(1)} \phi(y), \quad x, y \in \mathfrak{l}.$$

En effet, une algèbre de Lie Frobenius $\mathfrak{g}$ est un exemple simple d'une *algèbroïde vertex*, et l'algèbre vertex $V_{\mathfrak{g}}$ est son algèbre enveloppante, [GMS].

Maintenant partons d'une *algèbre commutative de Frobenius* (par la suite, on écrira plus simplement algèbre de Frobenius). Rappelons que c'est une k -algèbre commutative associative unitaire F , d'unité e , munie d'une forme k -bilinéaire symétrique

$$\langle, \rangle : F \times F \longrightarrow k$$

¹Laboratoire Emile Picard, Université Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse

telle que, pour tout x, y, z appartenant à F , on ait

$$\langle xy, z \rangle = \langle x, yz \rangle,$$

Nous appellerons le nombre

$$c := \langle e, e \rangle$$

la *charge* de F .

Exemple. Étant donné $c \in k$, l'algèbre de Frobenius k_c coïncide avec k comme une algèbre commutative, et $\langle x, y \rangle = xyc$.

Dans cette note on associe, de façon fonctorielle, à une algèbre commutative de Frobenius F une algèbre vertex $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ -graduée V_F . Pour $F = k_c$, V_F est l'algèbre vertex de Virasoro de charge centrale c (le module "vacuum" sur l'algèbre de Lie de Virasoro), [K]. Plus généralement, pour F arbitraire, l'unité $e \in F$ donne lieu à un vecteur de Virasoro dans V_F . On pourrait appeler les algèbres V_F *algèbres de Frobenius - Virasoro*.

En effet, on définit, par une méthode similaire à celle de [GMS], une notion d'une *algèbroïde de Virasoro*, dont l'algèbre de Frobenius est un cas très particulier. Nos algèbres V_F seront les algèbres enveloppantes de ces algèbroïdes.

2 Algèbres vertex du type Virasoro

On commence par regarder l'exemple de l'algèbre vertex de Virasoro. Cette algèbre vertex $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ -graduée $V = Vir_c$ (tous les objets considérés vivront au-dessus de k) est par définition engendrée par un vecteur L appartenant à V_2 qui vérifie l'OPE suivante :

$$L(z)L(w) \sim \frac{\frac{1}{2}c}{(z-w)^4} + \frac{2L(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial L(w)}{(z-w)}$$

(un nombre $c \in k$ étant fixé). Ceci est équivalent à :

$$L_{(3)}L = \frac{c}{2};$$

$$L_{(2)}L = 0;$$

$$L_{(1)}L = 2L;$$

$$L_{(0)}L = \partial L.$$

A partir de là, on en déduit que

$$V_0 = k.1;$$

$$V_1 = 0;$$

$$V_2 = k.L;$$

$$V_3 = k.\partial L.$$

On veut maintenant généraliser cet exemple en considérant les algèbres vertex qui possèdent une structure analogue à celle de l'algèbre de Virasoro. Soit

A un k -module; on regarde donc plus en détails les algèbres vertex du type suivant :

$$\begin{array}{c}
A = V_0 \\
\downarrow \partial \\
0 \\
\downarrow \partial \\
V_2 \\
\downarrow \partial \\
V_3 \simeq \partial V_2 \\
\downarrow \partial \\
\vdots
\end{array}$$

Donc $V_1 = 0$ et ∂ induit un isomorphisme de V_2 sur V_3 . Une telle algèbre vertex sera appelée une algèbre vertex *du type Virasoro*.

Soit V une telle algèbre vertex. Par la suite, et sauf indications contraires, on désignera les éléments de A par les lettres a, b, c et les éléments de V_2 par les lettres x, y et z . De plus, on abrégera la notation de l'opération (-1) en écrivant juste xy à la place de $x_{(-1)}y$, pour tout x, y dans V .

3 Premières remarques

L'opération (-1) , lorsqu'elle est restreinte à A , devient associative et commutative car $a_{(n)}b = 0$ pour tout $n \geq 0$; ce qui implique que le module A est muni d'une structure de k -algèbre unitaire (d'unité 1).

Par ailleurs, le fait que $V_1 = 0$ permet d'affirmer la trivialité de toutes les opérations de la forme $a_{(n)}y$ pour tout $y \in V$ et tout $n \neq -1$. En effet, on a :

$$a_{(n)}y = -\frac{1}{n+1}(\partial a)_{(n+1)}y = 0 \text{ car } \partial a \in V_1.$$

Si on s'intéresse maintenant à l'action de A sur V_2 , c'est-à-dire à l'opération $V_0 \times V_2 \xrightarrow{(-1)} V_2$, on s'aperçoit que :

$$\begin{aligned}
(ab)x &= abx + b_{(-2)}a_{(0)}x + a_{(-2)}b_{(0)}x + b_{(-3)}a_{(1)}x + a_{(-3)}b_{(1)}x + 0 \\
&= abx \quad \text{d'après la remarque précédente,}
\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
xa &= ax - \partial(a_{(0)}x) + \frac{\partial^2}{2}(a_{(1)}x) + 0 \\
&= ax \quad \text{toujours d'après la même remarque.}
\end{aligned}$$

Enfin, on sait que $1x = x$ pour tout $x \in V_2$. Ces trois équations nous permettent donc d'affirmer que l'opération (-1) induit une structure de A -module bilatère sur V_2 . Par ailleurs, le même raisonnement s'applique si on remplace V_2 par V_3 ; le k -module V_3 possède donc lui aussi une structure de A -module bilatère.

Pour terminer ces remarques, il faut voir que l'affirmation $V_3 \simeq \partial V_2$ n'est pas absurde : en effet, *a priori*, l'application ∂ n'est pas A -linéaire, mais seulement k -linéaire ; donc il serait plus naturel de penser qu'on peut seulement avoir $V_3 \simeq A\partial V_2$. Pour autant, comme $V_1 = 0$, on a $\partial A = 0$ et comme l'application ∂ est une dérivation, on peut écrire :

$$\partial(ax) = \partial(a)x + a\partial(x) = a\partial x.$$

Donc, dans ce cas particulier, ∂ est A -linéaire. On peut donc bien supposer que $V_3 \simeq \partial V_2$.

4 Structure de V_2

On veut maintenant regarder plus précisément les opérations présentes sur V_2 et quelles relations ces opérations vérifient. Les opérations qui nous intéressent vont donc être les suivantes :

- $V_2 \times V_2 \xrightarrow{(1)} V_2$;
- $V_2 \times V_2 \xrightarrow{(0)} V_3 \xrightarrow{\partial^{-1}} V_2$, cette seconde opération sera notée $(\tilde{0})$;
- $V_2 \times V_2 \xrightarrow{(3)} V_0$, cette dernière opération sera notée $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Remarque. *A priori*, il y a une quatrième opération à considérer : l'action de V_2 sur V_0 . Mais en regardant de plus près cette application, on s'aperçoit qu'elle est triviale. En effet :

$$x_{(1)}a = a_{(1)}x = 0,$$

d'après une des remarques initiales.

4.1 (1) : $V_2 \times V_2 \longrightarrow V_2$

$$\begin{aligned} x_{(1)}y &= y_{(1)}x - \underbrace{\partial(y_{(2)}x)}_{\in V_1} + \frac{\partial^2}{2} \underbrace{(y_{(3)}x)}_{\in V_0} \\ &= y_{(1)}x, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x_{(1)}y)_{(1)}z &= x_{(1)}y_{(1)}z + y_{(2)}x_{(0)}z - x_{(0)}y_{(2)}z - y_{(1)}x_{(1)}z \\ &= x_{(1)}y_{(1)}z - y_{(1)}x_{(1)}z + y_{(2)}x_{(0)}z \end{aligned}$$

or $y_{(2)}x_{(0)}z = -(x_{(0)}z)_{(2)}y = -\partial(\partial^{-1}(x_{(0)}z))_{(2)}y = 2(x_{(\tilde{0})}z)_{(1)}y$, donc

$$(x_{(1)}y)_{(1)}z = x_{(1)}y_{(1)}z - y_{(1)}x_{(1)}z + 2(x_{(\tilde{0})}z)_{(1)}y.$$

L'opération (1) est donc commutative, mais non associative.

$$(ax)_{(1)}y = a(x_{(1)}y) + x_{(0)}a_{(0)}y + a_{(-2)}x_{(2)}y + x_{(-1)}a_{(1)}y + a_{(-3)}x_{(3)}y = a(x_{(1)}y).$$

L'opération (1) possède donc en plus la propriété d'être A -bilinéaire.

4.2 $(\tilde{0}) : V_2 \times V_2 \longrightarrow V_3 \longrightarrow V_2$

$$\begin{aligned}
x_{(\tilde{0})}y &= \partial^{-1}(x_{(0)}y) \\
&= \partial^{-1}(-y_{(0)}x + \partial(y_{(1)}x)) \\
&= -y_{(\tilde{0})}x + y_{(1)}x.
\end{aligned}$$

Cette opération n'est donc pas commutative, mais on déduit de l'équation précédente que la partie symétrique de $(\tilde{0})$ est $\frac{1}{2}(1)$.

A -bilinéarité :

$$\begin{aligned}
(ax)_{(\tilde{0})}y &= \partial^{-1}((ax)_{(0)}y) \\
&= \partial^{-1}(a(x_{(0)}y) + x(a_{(0)}y) + a_{(-2)}(x_{(1)}y) + x_{(-2)}(a_{(1)}z) + a_{(-3)}(x_{(2)}y)) \\
&= \partial^{-1}(a(x_{(0)}y)) \quad \text{d'après la section 3} \\
&= a\partial^{-1}(a(x_{(0)}y)) \quad \text{car l'application } \partial^{-1} \text{ est } A\text{-linéaire} \\
&= ax_{(\tilde{0})}y.
\end{aligned}$$

L'opération $(\tilde{0})$ est donc A -linéaire par rapport à la première variable. Pour prouver la linéarité par rapport à la seconde variable, on utilise l'équation précédente et la A -bilinéarité de l'opération (1) . Ici encore, on a bien la A -bilinéarité de l'opération étudiée.

Relation d'"associativité" :

$$\begin{aligned}
(x_{(\tilde{0})}y)_{(\tilde{0})}z &= \partial^{-1}(\partial^{-1}(x_{(0)}y)_{(0)}z) \\
&= \partial^{-1}(-(x_{(0)}y)_{(1)}z) \\
&= -\partial^{-1}(x_{(0)}y_{(1)}z - y_{(1)}x_{(0)}z) \\
&= -x_{(\tilde{0})}y_{(1)}z + \partial^{-1}(y_{(1)}x_{(0)}z) \\
&= -x_{(\tilde{0})}y_{(1)}z + \partial^{-1}((x_{(0)}z)_{(1)}z - \partial((x_{(0)}z)_{(2)}y)) \\
&= -x_{(\tilde{0})}y_{(1)}z + \partial^{-1}(-(x_{(\tilde{0})}z)_{(0)}y) - (x_{(0)}z)_{(2)}y \\
&= -x_{(\tilde{0})}y_{(1)}z - (x_{(\tilde{0})}z)_{(\tilde{0})}y + 2(x_{(\tilde{0})}z)_{(1)}y.
\end{aligned}$$

4.3 $\langle \cdot, \cdot \rangle : V_2 \times V_2 \longrightarrow V_0$

$$\langle x, y \rangle = x_{(3)}y = y_{(3)}x - \partial(y_{(4)}x) + \cdots = y_{(3)}x = \langle y, x \rangle,$$

$$\langle ax, y \rangle = (a_{(-1)}x)_{(3)}y = a_{(-1)}x_{(3)}y + x_{(2)}a_{(0)}y + x_{(1)}a_{(1)}y = a_{(-1)}x_{(3)}y = a\langle x, y \rangle.$$

Ce crochet est donc bilinéaire symétrique.

5 Relations entre les opérations

On recherche maintenant les relations qu'il peut y avoir entre les différentes opérations sur V_2 .

$$\begin{aligned}
(x_{(\tilde{0})}y)_{(1)}z &= \frac{1}{2}(x_{(1)}y)_{(2)}z \\
&= -\frac{1}{2}(x_{(0)}y_{(2)}z - y_{(2)}x_{(0)}z) \\
&= \frac{1}{2}y_{(2)}x_{(0)}z \\
&= -\frac{1}{2}(x_{(0)}z)_{(2)}z \\
&= (x_{(\tilde{0})}z)_{(1)}y.
\end{aligned}$$

Maintenant, si on regarde l'équation d'"associativité" de l'opération $_{(1)}$, en prenant les différentes permutations circulaires en x , y et z et en sommant les trois équations obtenues, on trouve :

$$2Cycle_{x,y,z}(x_{(1)}y_{(\tilde{0})}z) = Cycle_{x,y,z}(x_{(1)}y_{(1)}z).$$

Par ailleurs,

$$\begin{aligned}
\langle x_{(\tilde{0})}y, z \rangle &= (x_{(\tilde{0})}y)_{(3)}z \\
&= -\frac{1}{4}(x_{(0)}y)_{(4)}z \\
&= -\frac{1}{4}(x_{(0)}y_{(4)}z - y_{(4)}x_{(0)}z) \\
&= -\frac{1}{4}(x_{(0)}z)_{(4)}y \\
&= \langle x_{(\tilde{0})}z, y \rangle,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle x_{(1)}y, z \rangle &= (x_{(1)}y)_{(3)}z \\
&= x_{(1)}y_{(3)}z + y_{(4)}x_{(0)}z - x_{(0)}y_{(4)}z - y_{(3)}x_{(1)}z \\
&= y_{(4)}x_{(0)}z - \langle y, x_{(1)}z \rangle \\
&= -(x_{(0)}z)_{(4)}y - \langle y, x_{(1)}z \rangle \\
&= 4\langle x_{(\tilde{0})}z, y \rangle - \langle y, x_{(1)}z \rangle.
\end{aligned}$$

Maintenant, si on prend les différentes permutations circulaires en x , y et z de l'équation précédente et en les sommant, on trouve :

$$Cycle_{x,y,z}\langle x_{(1)}y, z \rangle = 2Cycle_{x,y,z}\langle x_{(\tilde{0})}y, z \rangle.$$

6 Relation avec les algèbres de Frobenius

Dans les sections précédentes, nous avons donc mis en avant une structure particulière sur V_2 . Appelons *une algèbroïde de Virasoro* un couple $(A = V_0, V_2)$, où A est une k -algèbre commutative, V_2 est un A -module muni des trois opérations suivantes :

- $(1) : V_2 \times V_2 \longrightarrow V_2$ qui doit être symétrique A -bilinéaire ;
- $(\tilde{0}) : V_2 \times V_2 \longrightarrow V_2$ qui doit juste être A -bilinéaire ;
- $\langle \cdot, \cdot \rangle : V_2 \times V_2 \longrightarrow V_0$ qui doit être A -bilinéaire symétrique.

Par ailleurs, ces opérations doivent vérifier les six égalités suivantes :

$$(x_{(1)}y)_{(1)}z = x_{(1)}y_{(1)}z - y_{(1)}x_{(1)}z + 2(x_{(\tilde{0})}z)_{(1)}y \quad (1)$$

$$x_{(\tilde{0})}y = -y_{(\tilde{0})}x + y_{(1)}x \quad (2)$$

$$(x_{(\tilde{0})}y)_{(\tilde{0})}z = -x_{(\tilde{0})}y_{(1)}z - (x_{(\tilde{0})}z)_{(\tilde{0})}y + 2(x_{(\tilde{0})}z)_{(1)}y \quad (3)$$

$$(x_{(\tilde{0})}y)_{(1)}z = (x_{(\tilde{0})}z)_{(1)}y \quad (4)$$

$$\langle x_{(\tilde{0})}y, z \rangle = \langle x_{(\tilde{0})}z, y \rangle \quad (5)$$

$$\langle x_{(1)}y, z \rangle = 4\langle x_{(\tilde{0})}z, y \rangle - \langle y, x_{(1)}z \rangle \quad (6)$$

On dira aussi que V_2 est une algébroïde de Virasoro sur A .

Les considérations des sections précédentes fournissent le foncteur

$$t : (\text{Algèbres du type Virasoro}) \longrightarrow (\text{Algébroïdes de Virasoro}),$$

$$t(V) = (V_0, V_2)$$

Ce foncteur admet un adjoint à gauche U , dit *l'algèbre enveloppante*.

Si $\mathcal{A} = (A, V_2)$ est une algébroïde de Virasoro, alors on construit $U\mathcal{A}$ en deux étapes. D'abord, on définit à partir de $\mathcal{A}$ une algèbre vertex de $\text{Lie}^2 \mathbb{Z}_{\geq 0}$ -graduée (cf. [GMS], Définition 10.1)

$$L\mathcal{A} = A \oplus V_2 \oplus \partial V_2 \oplus \partial^2 V_2 \oplus \dots$$

Ici $\partial^i V_2$ est une copie de V_2 ; on introduit les opérations (n) , $n \geq 0$, sur $L\mathcal{A}$ de façon évidente.

Ensuite, on définit $U\mathcal{A}$ comme le quotient de l'enveloppe vertex de $L\mathcal{A}$ (cf. *op. cit.*, 10 (a)) par l'idéal vertex engendré par les éléments $a_{(-1)}x - ax$, $a \in A, x \in A \cup V_2$.

Donc, on aura

$$(U\mathcal{A})_0 = A, (U\mathcal{A})_1 = 0, (U\mathcal{A})_2 = V_2,$$

$$(U\mathcal{A})_3 = \partial V_2, (U\mathcal{A})_4 = \partial^2 V_2 \oplus S^2 V_2,$$

etc.

On veut maintenant voir qu'il est possible de considérer les algèbres de Frobenius comme des cas particuliers des algébroïdes de Virasoro.

Soit F une algèbre de Frobenius sur k . On définit alors les trois opérations (1) , $(\tilde{0})$ et (3) comme suit :

$$x_{(1)}y := 2xy,$$

$$x_{(\tilde{0})}y := xy,$$

$$\text{et } x_{(3)}y := \langle x, y \rangle.$$

²la terminologie de Frenkel - Ben-Zvi ; dans [K] un tel objet est appelé une algèbre conforme

Il reste alors à s'assurer que ces opérations vérifient bien toutes les propriétés requises par la définition d'une algèbroïde de Virasoro. Mais compte tenu de l'associativité et de la commutativité du produit dans la définition de l'algèbre de Frobenius, toutes ces vérifications sont immédiates. Donc F devient une algèbroïde de Virasoro sur k ; on la désigne par $Vir(F)$. L'algèbre vertex enveloppante $UVir(F)$ sera notée V_F .

Explicitement, V_F est déterminée par la propriété universelle suivante : pour une algèbre vertex V sur k quelconque, un morphisme d'algèbres vertex $V_F \longrightarrow V$ est la même chose qu'un morphisme de k -modules $\phi : F \longrightarrow V$ satisfaisant les conditions suivantes :

$$\begin{aligned}\phi(x)_{(1)}\phi(y) &= 2\phi(xy) \\ \phi(x)_{(0)}\phi(y) &= \partial\phi(xy) \\ \phi(x)_{(3)}\phi(y) &= \langle x, y \rangle \cdot 1_V\end{aligned}$$

Rôle de l'élément unité On va montrer maintenant que l'unité de l'algèbre de Frobenius initiale joue un rôle particulier dans notre nouvelle structure : en effet, elle peut être vue comme un vecteur de Virasoro dans V_F .

On commence par rappeler la définition d'un tel vecteur :

Définition. *Un vecteur de Virasoro de charge $c \in k$ dans une algèbre vertex $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ -graduée V est un élément $L \in V_2$ tel que*

$$L_{(0)} = \partial \tag{7}$$

$$L_{(1)|V_j} = jId; \tag{8}$$

$$L_{(2)}L = 0; \tag{9}$$

$$L_{(3)}L = \frac{c}{2}1. \tag{10}$$

Proposition. *L'élément unité e de l'algèbre de Frobenius F est un vecteur de Virasoro dans $V = V_F$.*

Démonstration. **Équation 7** Si a est un élément de V_0 , alors $e_{(0)}a \in V_1$ donc comme V_1 est nul, $e_{(0)}a = 0$ et par conséquent, $e_{(0)}$ coïncide avec ∂ sur V_0 .

Si $x \in V_2$, alors

$$\begin{aligned}e_{(0)}x &= \partial\partial^{-1}(e_{(0)}x) \\ &= \partial(e_{(\tilde{0})}x) \\ &= \partial(e.x) \\ &= \partial x.\end{aligned}$$

Dans ce cas, l'application $e_{(0)}$ coïncide encore avec ∂ .

Enfin, si $x \in V_3$, alors on peut trouver un élément y dans V_2 tel que $x = \partial y$; on a alors

$$\begin{aligned}e_{(0)}x &= e_{(0)}\partial y \\ &= \partial(e_{(0)}y) - \partial e_{(0)}y \\ &= \partial(\partial y) + 0.e_{(-1)}y \\ &= \partial x.\end{aligned}$$

Encore une fois, l'égalité recherchée est vérifiée.

On a donc bien $e_{(0)} = \partial$.

Équation 8 Soit a un élément de V_0 ; on sait que $e_{(1)}a = a_{(1)}e$ et une des remarques initiales nous permet alors d'affirmer que $e_{(1)}a = 0$. La condition recherchée est donc bien vérifiée pour V_0 .

Soit $x \in V_2$. Par construction, on a $e_{(1)}x = 2e.x = 2x$ et donc $e_{(1)|V_2} = 2Id$.

Soit $x \in V_3$. Il existe $y \in V_2$ tel que $\partial y = x$. D'où :

$$\begin{aligned} e_{(1)}x &= e_{(1)}\partial y \\ &= \partial(e_{(1)}y) - \partial e_{(1)}y \\ &= \partial(2y) + e_{(0)}y \\ &= 2\partial y + \partial y \\ &= 3\partial y. \end{aligned}$$

Au final, on a bien $e_{(1)|V_j} = jId$.

Équation 9 Cette condition est trivialement vérifiée car $e_{(2)}e$ est un élément de V_1 . $\square$

Bibliographie

[GMS] V.Gorbounov, F.Malikov, V.Schechtman, Gerbes of chiral differential operators. II. Vertex algebroids, *Inv. Math.*, **155** (2004), 605 - 680.

[K] V.Kac, Vertex algebras for the beginners, University Lecture Series, **10**, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 1997.